

三门峡市秋作物应对洪涝灾害技术措施

据最新气象资料分析，8月25日至27日，受低涡和切变线影响，我市有一次强降水天气过程，降水集中时段主要在26日。过程累计降水量40到80毫米，最大小时雨强20-40毫米，其中卢氏南部乡镇累计降水量可达100毫米以上。由于上一轮降水雨量大，间隔短，目前我市部分地区土壤偏湿，加之此轮降水过程累计降水量大，可能对农作物生长造成不利影响，要提前做好防范应对工作。

一、防洪排涝。密切关注天气变化，暴雨来临前，提前疏通沟渠，做好防洪排涝工作。天气放晴后，对低洼易涝或排灌不畅出现积水的田块，快速抢排田间积水，防止农作物因积水出现早衰现象。

二、扶捆培土。对玉米、油葵等倒伏严重的田块，及时将植株扶起，把相邻植株上部捆扎，互相连接，根部培土，防止再次倒伏；对倒伏程度相对较轻的田块，要及时进行扶直、培土，以增加通风透光，保持正常生长。

三、实施“一喷多促”。当前玉米等秋粮作物正处于灌浆初期，正是产量形成的关键时期，受灾田块要及时喷施叶面肥、抗逆剂、植物生长调节剂、杀菌杀虫剂等药剂，促使玉米和大豆植

株稳长，减轻灾害损失。

四、防治病虫害。当前，秋作物田间温度高、湿度大，正值多种病虫混合发生的高峰期，在突出抓好玉米南方锈病防治的基础上，做好玉米大小斑病、褐斑病、粘虫、玉米螟、以及大豆、花生等作物棉铃虫、甜菜夜蛾、造桥虫、叶斑病等病虫害的防治工作，要选择高效、安全、环境相溶性好的农药，采取综合防治措施，力争将病虫危害造成的损失降到最低限度。

五、加强田间管理。对未受灾的秋作物，要搞好“一喷多促”，强化病虫害防治，落实各项田间管理措施，以管理促增产，推广玉米晚收技术，确保玉米充分灌浆成熟，增加产量，弥补受灾地区的产量损失，实现以丰补歉，夺取秋粮生产丰收。